

Le Guilliguy à Ploudalmézeau



Autres habitats naturels du site



Propriétaires



Gestion communautaire

Suivi de la fréquentation

Afin de mettre en place des mesures appropriées de gestion de la fréquentation, il est tout d'abord nécessaire de comprendre les usages sur les sites, notamment par une évaluation du nombre de personnes qui les fréquentent. Ce suivi est réalisé à l'aide de compteurs enterrés sous les sentiers qui comptabilisent chaque passage. Ce dispositif permet d'effectuer un suivi heure par heure des passages. Le cumul de ces chiffres nous permet d'obtenir une évaluation de l'importance de la fréquentation et de préciser si celle-ci est la cause principale de la dégradation des habitats naturels ou seulement un des facteurs en cause.



Ourlet- Fourrés

Cette catégorie de milieu regroupe les massifs de Fougère aigle aussi appelés Ptéridaie, les roncières et les fourrés de Prunelliers. Ces habitats sont les stades de l'évolution des milieux naturels littoraux les plus avancés avant éventuellement l'apparition des arbres. Ils sont caractérisés par une faible diversité en espèces végétales. Ils sont aussi parfois le signe d'un passé agricole dont l'arrêt a permis leur installation. Le Prunellier aussi nommé « Epine noir » possède des baies, les prunelles, comestibles mais très âpres tant qu'elles n'ont pas subi les premières gelées. **Les Prunelliers** servent de postes de chant pour les petits oiseaux.

Les mâles s'installent sur les plus hautes branches et chantent afin d'indiquer à leurs congénères les limites de leur territoire mais aussi pour conquérir une femelle. Les roncières et les fourrés à Prunellier sont de très bons abris pour certains petits oiseaux nicheurs. L'un d'eux, l'**Accenteur mouchet**, y installe son nid, composé de brindilles, mousse et herbes sèches. Il en garnit l'intérieur de crin, de mousse et d'herbe fine.

1 Ptéridaie / 2 Prunellier / 3 Accenteur mouchet / 4 Suivi de la fréquentation